

## **NARKOSE VED RUBINSTEIN-TAYBIS SYNDROM (RTS):**

Hos barn og voksne med RTS kan det oppstå problemer under narkose. Man anbefaler at narkoselegen blir informert om dette.

To problemer kan forekomme:

- Hos noen få pasienter har man sett hypersensitivitet (overfølsomhet) for narkosemiddelet suksinylkolin (succinylcholine), og dette kan forårsake hypertermi (høy temperatur/feber). Siden dette bare er sett hos noen få pasienter med RTS, og det totale antall intervensjoner og operasjoner hos pasienter med RTS, som trenger narkose, er høyt, synes risikoen for denne komplikasjonen å være meget liten.
- Hos et betydelig antall pasienter med RTS, foreligger det en slapphet i muskulaturen i svelget (svelgveggen), som kan føre til at svelget klapper sammen (kollaberer) etter at det er gitt muskelavslappende medikament i forbindelse med narkosen. Dette kan føre til vansker med intuberingen (nedføring av tuben (plastslangen) til luftrøret). Dette problemet kan lett løses ved å intubere pasienten før man gir det muskelavslappende medikamentet. Siden kollaps i svelgveggen også kan skje i etterkant, vil mange pasienter trenge å være intubert i noe lenger tid, det vil si til de er helt våkne etter narkosen.

Orienteringen er basert på anbefalinger utarbeidet av professor Raoul CM Hennekam, Institute of Child Health / Great Ormond Street Hospital - London, og Academic Medical Centre - Amsterdam.

Frambu, 16.06.09.

David K. Bergsaker  
Overlege