

Brystkreft ved NF1

Nyere forskning viser at kvinner med NF1 har økt risiko for å utvikle brystkreft og at flere yngre kvinner med diagnosen får brystkreft enn ellers i befolkningen (1,2). Det er derfor viktig at alle voksne kvinner med NF1 gjennomfører regelmessig, systematisk selvundersøkelse av brystene allerede fra de er i 20-årene. Dersom det er tvil om hvordan dette utføres, eller om det oppdages forandringer i brystene, må fastlegen kontaktes.

Norsk gruppe for arvelig kreft (NSHG-Oslo 2016) har på grunnlag av denne nye kunnskap og erkjennelse foreslått følgende oppfølging/kontroll for kvinner med NF1: Årlig mammografi fra 30-50 år, deretter screening.

Dette betyr at fastlegen må henvise kvinner med NF1 i aldersgruppen 30-50 år, til mammografiundersøkelse fra de fyller 30 år.

Frambu, 3. juli 2016

David K. Bergsaker

Overlege

Frambu kompetansesenter

Cecilie Rustad

Overlege

Avdeling for medisinsk genetikk

Oslo universitetssykehus

- 1) Elina Uusitalo, Jussi Leppävirta, Anna Koffert, Sakari Suominen, Jussi Vahtera, Tero Vahlberg, Minna Pöyhönen, Juha Peltonen and Sirkku Peltonen "Incidence and Mortality of Neurofibromatosis: A Total Population Study in Finland." *Journal of Investigative Dermatology* 2014
- 2) Semingog OO, Goldacre MJ. "Age-specific risk of breastcancer in women with neurofibromatosis type 1." *Br.J Cancer* 2015:1546-8